

Épreuve de Mathématiques

Le correcteur tiendra compte de la rigueur dans la rédaction et de la clarté de la copie.

EXERCICE 1 [3pts]

- Déterminer la mesure principale des angles suivants : $\frac{-129\Pi}{5}$; $\frac{57\Pi}{4}$. (1 pt)
- Exprimer $\cos(2x)$ en fonction de $\cos x$, puis en fonction de $\sin x$. (1 pt)
- Déterminer $\cos\frac{\Pi}{12}$ et $\sin\frac{\Pi}{12}$. (1 pt)
(On pourra utiliser 2.)

EXERCICE 2 [3pts]

- Montrer que $(2 + 2\sqrt{3})^2 = 16 + 8\sqrt{3}$. (0,25 pt)
- Résoudre dans \mathbb{R} l'équation (E) : $4x^2 - (2 - 2\sqrt{3})x - \sqrt{3} = 0$. (0,75 pt)
- En déduire dans l'intervalle $[0; 2\Pi]$ la solution de l'équation :
(E') : $4\cos^2 x - (2 - 2\sqrt{3})\cos x - \sqrt{3} = 0$. (1 pt)
- Placer les images des solutions de l'équation (E') sur le cercle trigonométrique. (1 pt)

EXERCICE 3 [4pts]

ABCD étant un rectangle tel que $AB = 6$ et $AD = 8$.

- Construire le barycentre G de (A; 1) ; (B; 3) ; (C; 3) et (D; 1). (0,5 pt)
- I et J étant des milieux respectifs de [BC] et [AD] ;
démontrer que les points I, J et G sont alignés. (1 pt)
- Calculer GA^2 , GB^2 , GC^2 et GD^2 . (1 pt)
- Montrer que $MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 + MD^2 = 8MG^2 + GA^2 + 3GB^2 + 3GC^2 + GD^2$. (0,5 pt)
- Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 + MD^2 = 310$. (1 pt)

Problème [10pts]

Le problème comporte deux parties A et B.

Partie A [4,5pts]

Le plan est muni d'un repère orthogonal. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} ; x \mapsto \sin(-2x + \frac{\Pi}{6})$.

- Démontrer que f est une fonction périodique de période Π . (0,5 pt)
- f' est la fonction dérivée de f. Vérifier que sur l'intervalle $[0; \Pi]$, $\frac{\Pi}{3}$ et $\frac{5\Pi}{6}$ sont les deux solutions de l'équation : $f'(x) = 0$. (1 pt)
- Étudier le signe de $\cos(-2x + \frac{\Pi}{6})$ dans chacun des cas suivants :
 $x \in [0; \frac{\Pi}{3}]$; $x \in [\frac{\Pi}{3}; \frac{5\Pi}{6}]$; $x \in [\frac{5\Pi}{6}; \Pi]$. (1,5 pts)

4. En déduire le sens de variation de la restriction à $[0; \Pi]$ de la fonction f . Donner son tableau de variation.

Calculer $f(0)$ et $f(\Pi)$.

(1,5 pts)

Partie B [5,5pts]

Le plan est muni du repère orthonormé (O, I, J) .

On considère la fonction rationnelle f définie par $f(x) = \frac{3x^2+ax+b}{x^2+1}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f . (0,25 pt)

2. Déterminer les nombres réels a et b pour que la courbe (\mathcal{C}_f) de f soit tangente au point A d'abscisse 0 à la droite d'équation $y = 4x + 3$. (1 pt)

3. Pour les valeurs de a et b trouvées à la question 2., démontrer que pour tout réel x , $f(x) = 3 + \frac{4x}{x^2+1}$. (0,5 pt)

4. Calculer les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition et en déduire la nature de l'asymptote à la représentation de f . (0,75 pt)

5. Démontrer que le point $I(0;3)$ est centre de symétrie de (\mathcal{C}_f) . (0,5 pt)

6. Calculer la dérivée f' de la fonction f , étudier le signe de sa dérivée puis en déduire le sens de variation de la fonction f .


Donner son tableau de variation.

(1,5 pts)

7. Constuire (\mathcal{C}_f) , les asymptotes et la tangente en A à (\mathcal{C}_f) dans le repère orthonormé (O, I, J) .

(1,5 pts)

EXAMINATEUR : Département de Mathématiques.



«Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles : Disait SENEQUE»